

# Combien de temps mon enfant doit-il rester à la maison quand il est malade?



Image credit: Adobe Stock

**Sommaire :** Tous les enfants tombent malades à un moment donné. Avec certaines maladies, au lieu d'aller à l'école, votre enfant doit rester à la maison jusqu'à aller mieux.

Si votre enfant a été diagnostiqué avec l'une des conditions suivantes, votre enfant devra rester à la maison...

## Varicelle

- Dans les cas bénins (faible fièvre, moins de 30 boutons), l'exclusion n'est pas nécessaire pourvu que votre enfant se sente assez bien pour participer normalement à toutes les activités. Dans les cas moyens à graves (fièvre de plus de 38,5 °C ou de nombreux nouveaux boutons), gardez votre enfant à la maison pendant cinq jours après l'apparition de l'éruption cutanée.

## Diarrhée

- Jusqu'à 24 heures après que la diarrhée s'est arrêtée. La période d'exclusion pourrait varier selon la cause de la diarrhée et le mode de transmission.

## Cinquième maladie / "Syndrome des joues giflées"

- Jusqu'à ce que votre enfant se sente assez bien pour participer normalement à toutes les activités (pas nécessaire de rester loin des autres).

## Maladie main/pied/bouche

- Jusqu'à ce que votre enfant se sente assez bien pour participer normalement à toutes les activités. Les enfants qui ont des lésions dans la bouche ou des lésions suintantes devraient rester loin des autres.

## Impétigo

- Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit au moins une journée entière.

## Rougeole

- Au moins quatre jours après l'apparition de l'éruption cutanée.

## Conjonctivite

- Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit au moins une journée entière.

### Rubéole

- Au moins sept jours après l'apparition de l'éruption cutanée.

### Infection streptococcique de la gorge

- Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit pendant au moins 24 heures.

### Coqueluche

- Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit pendant au moins cinq jours. Si votre enfant ne suit aucun traitement, attendez trois semaines à partir du moment où la toux a commencé.

## Gardez votre enfant à la maison et loin des autres s'il présente l'un des symptômes suivant:

---

- Fièvre
- Éruption cutanée
- Mal de gorge
- Toux ou éternuements fréquents
- Écoulement jaunâtre ou verdâtre du nez, des oreilles ou des yeux
- Vomissements
- Diarrhée

Communiquez avec votre médecin de famille pour que ce dernier vous indique les soins et le traitement à donner en cas de maladie transmissible.

## Pour les personnes vivant dans le comté de Stormont Dundas Glengarry

---

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez [www.bseo.ca](http://www.bseo.ca) ou [www.cscestrie.on.ca](http://www.cscestrie.on.ca) ou Appel-santé au 1-800-267-7120

## About this Document

---

Écrit par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario ([www.eohu.ca](http://www.eohu.ca)).

## Clause de non-responsabilité

---

L'information contenue dans cette feuille de renseignements peut être utile pour votre enfant, ou non. Votre fournisseur de soins de santé est la meilleure source d'information concernant la santé de votre enfant.

## Licence

---

Vous êtes libre de copier et de distribuer ce document dans son intégralité aussi longtemps que 1) ce document ne soit pas utilisé d'une façon qui suggère que nous vous approuvons ou votre utilisation du document, 2) ce matériel ne soit pas utilisé à des fins commerciales (non commerciales), 3) que ce matériel ne soit pas modifié d'aucune façon (pas de travaux dérivés). Consultez la licence complète à l'adresse <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca>